泌尿器科がんレジメン

No	対象	レジメン名（投与量）	1サイクル（日）
1	前立腺がん	DTX（75）	21
2	前立腺がん	DTX（70）	21
3	前立腺がん	DTX（55）	21
4	尿路上皮がん	GC（1000/70）	28
5	尿路上皮がん	GEM+CBDCA（1000/5）	21
6	尿路上皮がん	キイトルーダ（200）	21
7	尿路上皮がん	キイトルーダ（400）	42
8	腎細胞がん	レンビマ+キイトルーダ（20/200）	21
9	腎細胞がん	レンビマ+キイトルーダ（20/400）	42
10	精巣腫瘍	BEP（30/100/20）	21
11	尿路上皮がん	パドセブ（1.25）	28

2025.1 作成

No.1

DTX

※前立腺がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)				
			1日目	・・・・・	8日目	・・・・・	22日目
1	デキサート注射液6.6mg　1V 生理食塩液　50mL	15分	●				●
2	タキソテール注 75mg/㎡ 生理食塩液　250mL	60分	●				●
3	生理食塩液　50mL	FREE	●				●

★タキソテールの総投与量が300-400mg/㎡に達すると浮腫の発現率が高くなる（DTXによる血管透過性亢進にため）

2024.7 作成

No.2

DTX70

※前立腺がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)				
			1日目	・・・・・	8日目	・・・・・	22日目
1	デキサート注射液6.6mg　1V 生理食塩液　50mL	15分	●				●
2	タキソテール注 **70**mg/㎡ 生理食塩液　250mL	60分	●				●
3	生理食塩液　50mL	FREE	●				●

★タキソテールの総投与量が300-400mg/㎡に達すると浮腫の発現率が高くなる（DTXによる血管透過性亢進にため）

2024.7 作成

No.3

DTX55

※前立腺がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)				
			1日目	・・・・・	8日目	・・・・・	22日目
1	デキサート注射液6.6mg　1V 生理食塩液　50mL	15分	●				●
2	タキソテール注 **55**mg/㎡ 生理食塩液　250mL	60分	●				●
3	生理食塩液　50mL	FREE	●				●

★タキソテールの総投与量が300-400mg/㎡に達すると浮腫の発現率が高くなる（DTXによる血管透過性亢進にため）

2024.7 作成

No.4

GC療法(GEM+CDDP)

※尿路上皮がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(28日間)										
			1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	・・・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	29日目
1	デキサート注射液6.6mg　1V 生理食塩液　50mL	15分	●						●		●		●
2	ゲムシタビン 1000mg/㎡ 5%ブドウ糖液　100mL	30分	●						●		●		●
3	生理食塩液　50mL	FREE	●						●		●		●
1'	パロノセトロン静注0.75mg　1V デキサート注射液6.6mg　1V アロカリス点滴静注235mg　1V 生理食塩液　50mL	30分		●									
2'	硫酸マグネシウム補正液　4mL KCL注キット　10mL 生理食塩液　500mL	60分		●									
3'	フロセミド注20mg　1A 生理食塩液　50mL	5分		●									
4'	生理食塩液　50mL	FREE		●									
5'	シスプラチン注　70mg/㎡ 生理食塩液　500mL	120分		●									
6'	硫酸マグネシウム補正液　4mL KCL注キット　10mL 生理食塩液　500mL	60分		●									
7'	ソリタ-T3号　500mL	60分		●									
8'	ソリューゲンF　500mL	60分		●									
内服	デカドロン錠4mg　2錠/朝・夕食後				●	●	●						

★シスプラチンの総投与量300mg～500mg/m2以上で聴力障害(高音域)が起きやすい。

2024.7 作成

No.5

GEM+CBDCA

※尿路上皮がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)							
			1日目	2日目	3日目	4日目	・・・・・	8日目	・・・	22日目
1	デキサート注射液6.6mg　1V 生理食塩液　50mL	15分						●		●
2	ゲムシタビン 1000mg/㎡ 5%ブドウ糖液　100mL	30分						●		●
3	生理食塩液　50mL	FREE						●		●
1’	パロノセトロン静注0.75mg　1V デキサート注射液6.6mg　1V アロカリス点滴静注235mg　1V 生理食塩液　50mL	30分	●							
2’	ゲムシタビン 1000mg/㎡ 5%ブドウ糖液　100mL	30分	●							
3’	パラプラチン注射液　AUC5 生理食塩液　250mL	60分	●							
4’	生理食塩液　50mL	FREE	●							
内服	デカドロン錠4mg　2錠/朝・夕食後			●	●	●				

2024.7作成

No.6

キイトルーダ200

※尿路上皮がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)		
			1日目	・・・・・	22日目
1	生理食塩液　50mL(点滴ライン確保用)	FREE	●		●
2	キイトルーダ点滴静注　200mg 生理食塩液　100mL	30分	●		●
3	生理食塩液　50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●

2024.7 作成

No.7

キイトルーダ400

※尿路上皮がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(42日間)		
			1日目	・・・・・	43日目
1	生理食塩液　50mL(点滴ライン確保用)	FREE	●		●
2	キイトルーダ点滴静注　400mg 生理食塩液　100mL	30分	●		●
3	生理食塩液　50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●

2024.7 作成

No.8

レンビマ＋キイトルーダ200

※腎細胞がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)		
			1日目	・・・・・	22日目
1	生理食塩液　50mL(点滴ライン確保用)	FREE	●		●
2	キイトルーダ点滴静注　200mg 生理食塩液　100mL	30分	●		●
3	生理食塩液　50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●
内服	レンビマ　1回20mg　1日1回　朝食後		● （初日は夕食後に内服）	●●●●●● （連日内服）	● （初日は夕食後に内服）

□初回は手足症候群予防としてヘパリン類似物質クリーム処方あり

★レンビマ減量：20mg→14mg→10mg→8mg→4mg

2024.7 作成

No.9

レンビマ＋キイトルーダ400

※腎細胞がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(42日間) 1日目	・・・・・	43日目
1	生理食塩液　50mL(点滴ライン確保用)	FREE	●		●
2	キイトルーダ点滴静注　400mg 生理食塩液　100mL	30分	●		●
3	生理食塩液　50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●
内服	レンビマ　1回20mg　1日1回　朝食後		● （初日は夕食後に内服）	●●●●●● （連日内服）	● （初日は夕食後に内服）

□初回は手足症候群予防としてヘパリン類似物質クリーム処方あり

★レンビマ減量：20mg→14mg→10mg→8mg→4mg

2024.7 作成

No.10

BEP ブレオマイシン(BLM) ラステット(VP-16) シスプラチン(CDDP)

※精巣腫瘍

1コース(21日間)

順序	治療内容	投与時間	0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	・・・・・	9日目	・・・	16日目	・・・	21日目	22日目
入院注射	ソリューゲン500mL（21：30-3：30）	6時間	●											●	
入院注射	アクメイン500mL（3：30-9：30）	6時間	●											●	
1	ソリューゲン500mL（9：30-11：30）	2時間		●	●	●	●	●							●
2 （側管）	生理食塩水100mL（10：00-10：30） フロセミド注20mg	30分		●	●	●	●	●							●
3 （側管）	生理食塩水50mL（11：00-11：15） パロノセトロン静注0.75mg　1V デキサート注射液6.6mg　1V	15分		●											●
3' （側管）	生理食塩水50mL（11：00-11：15） デキサート注射液6.6mg　1V	15分			●	●	●	●							
4	生理食塩液　500mL（11：30-13：30） シスプラチン注　20mg/㎡	2時間		●	●	●	●	●							●
5	生理食塩液　500mL（13：30-15：30） ラステット注　100mg/㎡	2時間		●	●	●	●	●							●
6	アクメイン500mL（15：30-21：30）	6時間		●	●	●	●	●							●
7 （側管）	生理食塩水100mL（16：30-17：00） フロセミド注20mg	30分		●		●	●	●							●
7'-1 （側管）	生理食塩水100mL（15：30-16：00 day2） ソル・コーテフ注100mg	30分			●					● メインルート		● メインルート			
7'-2 （側管）	生理食塩水100mL（16：00-16：30 day2） ブレオ注　30mg/body	30分			●					● メインルート		● メインルート			
7'-3 （側管）	生理食塩水100mL（16：30-17：00） フロセミド注20mg	30分			●										
8	ソリューゲン500mL（21：30-3：30）	6時間		●	●	●	●	●							●
9	アクメイン500mL（3：30-9：30）	6時間													
10	生理食塩水50mL	FREE								●		●			
内服	イメンド125mg 1錠			●	●										●
内服	イメンド80mg 1錠/朝食後				●	●	●	●							

★前日に入院し、前日から入院注射でhydration

★シスプラチン注入量分を抜く

2024.7作成

No.11

パドセブ療法

※尿路上皮がん

順序	治療内容	投与時間	1コース(28日間)										
			1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	・・・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	29日目
1	デキサート注射液6.6mg　1V 生理食塩液　50mL	15分	●						●		●		●
2	パドセブ点滴静注　1.25mg/kg 注射用水　20mL 生理食塩液　100mL	30分	●						●		●		●
3	生理食塩液　50mL	FREE	●						●		●		●

2025.3 作成