

乳がん

No	レジメン名（投与量）	1サイクル（日）
1	TC（DTX+CPA）（75/600）	21
2	CMF（500/40/600）	21
3	FEC100（500/100/500）	21
4	Tri-weekly DTX(75)	21
5	Tri-weekly Tmab(8→6)	21
6	PTX + BEV(90/10)	28
7	DTX + パー ジェ タ + Tmab（75/840→420/8→6）	21
8	ハラヴェン（1.4）	21
9	カドサイラ（3.6）	21
10	VNR（25）	21
11	GEM（1250）	21
12	nab-PTX（260）	21
13	weekly PTX（80）	21
14	Tri-weekly PTX(175)	21
15	weekly Tmab + PTX(4→2/80 [※])※PTXはd8d15d22	28
16	weekly Tmab + ハラヴェン(4→2/1.4 [※])※ハラヴェンはd1d8	21
17	weekly Tmab(4→2)	7
18	VNR+BEV(25/5)	14
19	パー ジェ タ + Tmab（75/840→420/8→6）	21
20	ハラヴェン + パー ジェ タ + Tmab（75/840→420/8→6）	21
21	EC（90/600）	21

2025.1 作成

No.1

TC(DTX+CPA)

※閉鎖式接続機器使用

			1コース(21日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	22日目
1	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●
2	タキソテール注 75mg/m ² 生理食塩液 250mL	60分	●		●
3	エンドキサン 600mg/m ² 生理食塩液 100mL	30分	●		●
4	生理食塩液 50mL	FREE	●		●

★タキソテールの総投与量が300-400mg/m²に達すると浮腫の発現率が高くなる（DTXによる血管透過性亢進のため）

No.2

CMF

※閉鎖式接続機器使用

			1コース(21日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	22日目
1	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●
2	メトトレキセート 40mg/m ² 生理食塩液 50mL	15分	●		●
3	エンドキサン 500mg/m ² 生理食塩液 100mL	30分	●		●
4	フルオロウラシル注 600mg/m ² 生理食塩液 50mL	15分	●		●
5	生理食塩液 50mL	FREE	●		●

No.3

FEC100

※閉鎖式接続機器使用

			1コース(21日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	2日目	3日目	4日目	・ ・ ・ ・ ・	22日目	
点滴前	イメンドカプセル125mg 1CP 内服		●					●	
1	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●					●	
2	エピルビシン塩酸塩注 100mg/m ² 生理食塩液 100mL	15分	●					●	
3	エンドキサン 500mg/m ² 生理食塩液 100mL	30分	●					●	
4	フルオロウラシル注 500mg/m ² 生理食塩液 50mL	15分	●					●	
5	生理食塩液 50mL	FREE	●					●	
内服	イメンドカプセル80mg 1CP デカドロン錠4mg 2錠/朝・夕食後			● ●	● ●	● ●	●		

※イメンド125mgは院内で内服済み

★補助化学療法は4～6回。

★エピルビシンの総投与量が900mg/m²を超えた場合、うっ血性心不全発症頻度が上昇するとの報告あり。

★支持療法として、抗菌薬が処方された場合は熱発時に服用開始し、飲み切ってもらうこと。

No.4

Tri-weekly DTX

			1コース(21日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	・ ・ ・ ・ ・	22日目
1	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●
2	タキソテール点滴静注 75mg/m ² 生理食塩液 250mL	60分	●		●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●		●

★タキソテールの総投与量が300-400mg/m²に達すると浮腫の発現率が高くなる（DTXによる血管透過性亢進のため）

No.5

Tri-weekly Tmab

			1コース(21日間)				
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	22日目
1 (初回のみ)	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●				
1'	生理食塩液 50mL(点滴ライン確保用)	15分					●
2	トラスツズマブBS点滴静注用 初回8mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	90分	●				
3	トラスツズマブBS点滴静注用 2回目以降6mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	30分					●
3	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●				●

No.6

PTX+BEV

			1コース(28日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	29日目
点滴前	ビラノア錠20mg 1錠 内服		●		●		●		●
1	グラニセトン静注3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V ガスター注射液20mg 1A 生理食塩液 50mL	15分	●		●		●		●
2	アバスチン点滴静注 10mg/kg 生理食塩液 100mL	90分	●				●		
3	パクリタキセル注 90mg/m ² 生理食塩液 250mL	60分	●		●		●		●
4	生理食塩液 50mL	FREE	●		●		●		●

※ビラノアは院内で内服済み

No.7

DTX+パージェタ+Tmab

1コース目

順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	22日目	・・・
1	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●	
2 (初回のみ)	パージェタ点滴静注 840mg 生理食塩液 250mL	60分	●			
2'	パージェタ点滴静注 420mg 生理食塩液 250mL	30分			●	
3 (初回のみ)	トラスツズマブBS点滴静注用 8mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	90分	●			
3'	トラスツズマブBS点滴静注用 6mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	30分			●	
4	タキソテール点滴静注 75mg/m ² 生理食塩液 250mL	60分	●		●	
5	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●	

★タキソテールの総投与量が300-400mg/m²に達すると浮腫の発現率が高くなる（DTXによる血管透過性亢進のため）

No.8

ハラヴェン

			1コース(21日間)				
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・・・・	22日目
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●		●
2	ハラヴェン静注 1.4mg/m ² 生理食塩液 100mL	2～5分 (全開で)	●		●		●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●		●		●

No.9

カドサイラ

			1コース(21日間)			
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	・・・・・・	22日目
1 (初回のみ)	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●			
1'	生理食塩液 50mL(点滴ライン確保用)	FREE				●
2	カドサイラ点滴静注 3.6mg/kg 生理食塩液 250mL	90分	●			●
3	生理食塩液 50mL(ライン洗浄用として)	FREE	●			●

No.10

VNR

※末梢より投与する場合：ソリタT3はメインから、他は側管から

			1コース(21日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	22日目
1	ソリタ-T3号 200mL	60分	●		●				●
2	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●				●
3	ロゼウス静注液 25mg/m ² 生理食塩液 50mL	全開で投与	●		●				●
4	生理食塩液 50mL(ライン洗浄用として)	FREE	●		●				●

※CVポートより投与する場合

			1コース(21日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	22日目
1	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●				●
2	ロゼウス静注液 25mg/m ² 生理食塩液 50mL	全開で投与	●		●				●
3	生理食塩液 50mL(ライン洗浄用として)	FREE	●		●				●

No.11

GEM

			1コース(21日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	22日目
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●				●
2	ゲムシタビン 1250mg/m ² 5%ブドウ糖液 100mL	30分	●		●				●
3	生理食塩液 50mL(ライン洗浄用として)	FREE	●		●				●

No.12

nab-PTX

			1コース(21日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	22日目
1	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●
2	アブラキサン点滴静注用 260mg/m ² 生理食塩液 100mL	30分	●		●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●		●

No.13

Weekly PTX

			1コース(28日間)								
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	22日目	・・・	29日目
点滴前	ビラノア錠20mg 1錠 内服		●		●		●				●
1	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V ガスター注射液20mg 1A 生理食塩液 50mL	15分	●		●		●				●
2	パクリタキセル注 80mg/m ² 生理食塩液 250mL	60分	●		●		●				●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●		●		●				●

※ビラノアは院内で内服済み

No.14

Tri-weekly PTX

			1コース(21日間)						
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	22日目
点滴前	ビラノア錠20mg 1錠 内服		●						●
1	デキサート注射液6.6mg 3V ガスター注射液20mg 1A 生理食塩液 50mL	15分	●						●
2	グラニセトロン静注液3mg 1A 生理食塩液 100mL	30分	●						●
3	パクリタキセル注 175mg/m² 生理食塩液 500mL	180分	●						●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●						●

※ビラノアは院内で内服済み

No.15

weeklyTmab+PTX

順序	治療内容	投与時間	1コース目		※その後はWeeklyで投与					
			1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	22日目	・・・
点滴前	ビラノア錠20mg 1錠 内服				●		●		●	
1 (初回のみ)	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●							
1'	グラニセトロン静注3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V ガスター注射液20mg 1A 生理食塩液 50mL	15分			●		●		●	
2 (初回のみ)	トラスツズマブBS点滴静注用 4mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	90分	●							
2'	トラスツズマブBS点滴静注用 2mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	30分			●		●		●	
3	パクリタキセル注 80mg/m ² 生理食塩液 250mL	60分			●		●		●	
4	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●		●		●	

※ビラノアは院内で内服済み

No.16

weeklyTmab+ハラヴェン

			1コース目(21日間)							
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	15日目	・・・	22日目	・・・
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●				●	
1'	生理食塩液 50mL(点滴ライン確保用)	FREE					●			
2 (初回のみ)	トラスツズマブBS点滴静注用 4mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	90分	●							
2'	トラスツズマブBS点滴静注用 2mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	30分			●		●		●	
3	ハラヴェン静注 1.4mg/m ² 生理食塩液 100mL	2～5分 (全開で)	●		●				●	
4	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●		●		●	

No.17

weekly Tmab

			1コース(7日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目
1 (初回のみ)	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		
1'	生理食塩液 50mL(点滴ライン確保用)	FREE			●
2	トラスツズマブBS点滴静注用 初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	90分	●		●
3	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●

No.18

VNR+BEV

※ソリタT3はメインから、他は側管から

			1コース(21日間)		
順序	治療内容	投与時間	1日目	．．．．．	15日目
1	ソリタ-T3号 200mL	60分	●		●
2	グラニセトロン静注液3mg 1A デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●
3	ロゼウス静注液 25mg/m ² 生理食塩液 50mL	全開で投与	●		●
4	生理食塩液 50mL(ライン洗浄用として)	FREE	●		●
5	アバスチン点滴静注 5mg/kg 生理食塩液 100mL	90分	●		●
6	生理食塩液 50mL(ライン洗浄用として)	FREE	●		●

No.19

パージェタ+Tmab

1コース目

順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	22日目	・・・
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●	
2 (初回のみ)	パージェタ点滴静注 840mg 生理食塩液 250mL	60分	●			
2'	パージェタ点滴静注 420mg 生理食塩液 250mL	30分			●	
3 (初回のみ)	トラスツズマブBS点滴静注用 8mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	90分	●			
3'	トラスツズマブBS点滴静注用 6mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	30分			●	
4	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●	

No.20

ハラヴェン+パージェタ+Tmab

1コース目

順序	治療内容	投与時間	1日目	・・・	8日目	・・・	22日目	・・・
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●		●	
2 (初回のみ)	パージェタ点滴静注 840mg 生理食塩液 250mL	60分	●					
2'	パージェタ点滴静注 420mg 生理食塩液 250mL	30分					●	
3 (初回のみ)	トラスツズマブBS点滴静注用 8mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	90分	●					
3'	トラスツズマブBS点滴静注用 6mg/kg 注射用水 20mL 生理食塩液 250mL	30分					●	
4	ハラヴェン静注 1.4mg/m ² 生理食塩液 50mL	2～5分 (全開で)	●		●		●	
5	生理食塩液 50mL(点滴ライン洗浄用)	FREE	●		●		●	

No.21

EC

※閉鎖式接続機器使用

1コース(21日間)								
順序	治療内容	投与時間	1日目	2日目	3日目	4日目	・・・	22日目
1	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1.5V アロカリス点滴注射235mg 1V 生理食塩液 50mL	30分	●					●
2	エピルビシン塩酸塩注 90mg/m ² 生理食塩液 100mL	15分	●					●
3	エンドキサン 600mg/m ² 生理食塩液 100mL	30分	●					●
4	生理食塩液 50mL	FREE	●					●
	デカドロン錠4mg 2錠/朝・夕食後			●	●	●		

★予定4サイクル

★エピルビシンの総投与量が900mg/m²を超えた場合、うっ血性心不全発症頻度が上昇するとの報告あり。

★支持療法として、抗菌薬が処方された場合は熱発時に服用開始し、飲み切ってもらうこと。