

小細胞肺がん

No	レジメン名（投与量）	1サイクル（日）
1	«PI» CDDP+IRI (60/60)	28
2	«CE» CBDCA+VP-16 (5/100)	21
3	CBDCA+VP-16+テセントリク (5/100/1200)	21
4	CDDP+VP-16+イミフィンジ (80/100/1500)	21
5	テセントリク (1200) (維持療法)	21
6	イミフィンジ (1500) (維持療法)	28
7	AMR (45)	21or28
8	ハイカムチン (1)	21
9	IRI (100)	28
10	weekly CDDP+IRI (25/60)	14

2025.3 作成

No.1

1コース(28日間)

«PI» CDDP+IRI療法

【高度催吐性リスクレジメン】

順序	治療内容	投与時間	1コース(28日間)											
			1日目	2日目	3日目	4日目	...	8日目	...	15日目	...	28日目	29日目	
	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分						●		●				
1	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1.5V(9.9mg) アロカリス点滴静注235mg 1V 生理食塩液 50mL	30分	●										●	
2	ソリタ-T2号 500mL 硫酸マグネシウム補正液(1mEq/mL) 5mL	60分	●										●	
3	フロセミド注20mg 1A 生理食塩液 50mL	FREE	●										●	
4	生理食塩液 50mL (洗浄用)	FREE	●										●	
5	イリノテカンド注 60mg/m ² 生理食塩液500mL	90分	●					●		●			●	
6	シスプラチンド注 60mg/m ² 生理食塩液500mL	60分	●										●	
7	ソリタ-T2号 500mL 硫酸マグネシウム補正液(1mEq/mL) 5mL	60分	●										●	
	生理食塩液 50mL	FREE			●	●	●		●	●				
内服	デカドロン錠4mg 2錠/朝・夕食後													

★シスプラチンドの総投与量300mg～500mg/m²以上で聴力障害(高音域)が起きやすい。

★即発性の下痢には、ブスコパンを内服。遅発性の下痢には、ロペラミドを使用。遅発性下痢がひどい場合は脱水に注意が必要である。

No.2

1コース(21日間)

«CE» CBDCA+VP-16療法

【高度催吐性リスクレジメン】

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)								
			1日目	2日目	3日目	4日目	21日目	22日目	
	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分		●	●						
1	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1V アロカリス点滴静注235mg 1V 生理食塩液 50mL	30分	●							●	
2	ラステット注 100mg/m ² 5%ブドウ糖注射液 500mL	60分	●	●	●					●	
3	パラプチナ注射液 AUC5 生理食塩液250mL	60分	●							●	
4	生理食塩液 50mL	FREE		●	●						
内服	デカドロン錠4mg 2錠/朝・夕食後					●					

No.3

1コース(21日間)

CBDCA+VP-16+テセントリク療法

【高度催吐性リスクレジメン】

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)								
			1日目	2日目	3日目	4日目	21日目	22日目	
	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分		●	●						
1	生理食塩液 50mL	FREE	●							●	
2	テセントリク点滴静注 1200mg/body 生理食塩液250mL	60分	●							●	
3	生理食塩液 50mL (点滴ライン洗浄用)	FREE	●							●	
4	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1V アロカリス点滴静注235mg 1V 生理食塩液 50mL	30分	●							●	
5	ラステット注 100mg/m ² 5%ブドウ糖注射液 500mL	60分	●	●	●					●	
6	パラプラチン注射液 AUC5 生理食塩液250mL	60分	●							●	
4	生理食塩液 50mL	FREE	●	●	●					●	
内服	デカドロン錠4mg 2錠/朝・夕食後					●					

No.4

1コース(21日間)

CDDP+VP-16+イミフィンジ療法

【高度催吐性リスクレジメン】

		投与時間	1コース(21日間)								22日目
順序	治療内容		1日目	2日目	3日目	4日目	21日目		
	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分		●	●						
1	生理食塩液 50mL	FREE	●							●	
2	イミフィンジ点滴静注 1500mg/body 生理食塩液250mL	60分	●							●	
3	生理食塩液 50mL (点滴ライン洗浄用)	FREE	●							●	
4	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1.5V (9.9mg) アロカリス点滴静注235mg 1V 生理食塩液 50mL	30分	●							●	
5	ラステット注 100mg/m ² 5%ブドウ糖注射液 500mL	60分	●	●	●					●	
6	ソリタ-T2号 500mL 硫酸マグネシウム補正液(1mEq/mL) 5mL	60分	●							●	
7	フロセミド注20mg 1A 生理食塩液 50mL	FREE	●							●	
8	生理食塩液 50mL	FREE	●							●	
9	シスプラチニ注 80mg/m ² 生理食塩液250mL	120分	●							●	
10	ソリタ-T2号 500mL 硫酸マグネシウム補正液(1mEq/mL) 5mL	60分	●							●	
	生理食塩液 50mL	FREE		●	●			●			
内服	デカドロン錠4mg 2錠/朝・夕食後										

★シスプラチニの総投与量300mg～500mg/m²以上で聽力障害(高音域)が起きやすい。

No.5

1コース(21日間)

テセントリク療法（維持療法）

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)					22日目
			1日目	21日目		
1	生理食塩液 50mL	FREE	●					●
2	テセントリク点滴静注 1200mg/body 生理食塩液250mL	60分	●					●
3	生理食塩液 50mL (点滴ライン洗浄用)	FREE	●					●

No.6

イミフィンジ療法（維持療法）

順序	治療内容	投与時間	1コース(28日間)					29日目
			1日目	・・・	・・・	28日目		
1	生理食塩液 50mL	FREE	●					●
2	イミフィンジ点滴静注 1500mg/body 生理食塩液250mL	60分	●					●
3	生理食塩液 50mL (点滴ライン洗浄用)	FREE	●					●

No.7

1コース(21or28日間)

AMR療法

順序	治療内容	投与時間	1コース(21or28日間)					
			1日目	2日目	3日目	...	21日目 (28日目)	22日目 (29日目)
メイン1	生理食塩液 500mL	30分	●	●	●			●
側管1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分		●	●			
側管1	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●					●
側管2	カルセド注射用 45mg/m ² 生理食塩液20mL 1A	5分以上かけて bolus	●	●	●			●
側管3	生理食塩液20mL 1A	FREE	●	●	●			●

No.8

1コース(21日間)

ハイカムチン療法

順序	治療内容	投与時間	1コース(21日間)								
			1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	...	21日目	22日目	
1	デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●	●	●	●	●			●	
側管2	ハイカムチン注射用 1 mg/m ² 生理食塩液100mL 1V	30分	●	●	●	●	●			●	
側管3	生理食塩液50mL 1A	FREE	●	●	●	●	●			●	

No.9

IRI (100) 療法

順序	治療内容	投与時間	1コース(28日間)							
			1日目	...	8日目	...	15日目	...	28日目	29日目
1	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●		●			●
2	イリノテカン注 100mg/m ² 生理食塩液500mL	90分	●		●		●			●
3	生理食塩液 50mL	FREE	●		●		●			●

★即発性の下痢には、ブスコパンを内服。遅発性の下痢には、ロペラミドを使用。遅発性下痢がひどい場合は脱水に注意が必要である。

No.10

1コース(14日間)

weekly CDDP+IRI療法

1コース(14日間)

順序	治療内容	投与時間	1日目	...	8日目	...	14日目	15日目
1	パロノセトロン静注0.75mg 1V デキサート注射液6.6mg 1V 生理食塩液 50mL	15分	●		●			●
2	イリノテカン注 60mg/m ² 生理食塩液500mL	90分	●		●			●
3	シスプラチナ注 25mg/m ² 生理食塩液500mL	120分	●		●			●
4	生理食塩液 500mL (水分負荷とライン洗浄用)	120分	●		●			●

★シスプラチナの総投与量300mg～500mg/m²以上で聴力障害(高音域)が起きやすい。

★即発性の下痢には、ブスコパンを内服。遅発性の下痢には、ロペラミドを使用。遅発性下痢がひどい場合は脱水に注意が必要である。